



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی قزوین
دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه:

جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی

موضوع:

بررسی شیوع حرکت پاتولوژیک دندانهای قدامی
در بیماران مبتلا به پریودنتیت متوسط تا شدید

استاد راهنما:

خانم دکتر شیوا طاهری

استاد مشاور:

آقای دکتر پرویز پدیسار

نگارش:

پگاه محاورى - نوشین علیپور

خلاصه و نتیجه گیری

هدف از این تحقیق برآورد میزان شیوع حرکت پاتولوژیک دندانهای قدامی در بیماران با پریدونتیت متوسط تا شدید در مراکز درمانی شهر قزوین بود که برای حصول به این منظور ۱۰۰ نفر از مبتلایان به پریدونتیت متوسط تا شدید مورد بررسی قرار گرفتند و پرسشنامه های مربوطه تکمیل گردید. وابستگی میان حرکت پاتولوژیک دندانهای قدامی و از دست دادن اتچمنت (Attachment loss) بررسی شد و شایع ترین فرم حرکت پاتولوژیک شناسایی شد. معیار انتخاب بیماران به قرار زیر بود:

- ۱- بیماران فاقد مشکلات سیستمیک و یا حالات آلرژیک باشند. (همچنین عدم وجود بارداری در خانمها)
- ۲- بیماران در گذشته تحت جراحی پریدونتال یا درمان ارتودنسی قرار نگرفته باشند.
- ۳- بیماران مبتلا به پریدونتیت متوسط تا شدید باشند.
- ۴- سابقه ضربه به دندانهای قدامی وجود نداشته باشد.
- ۵- بیماران مبتلا به پریدونتیت جوانان و پریدونتیت سریع پیشرفت کننده (Rapidly Progressive P.) نیز در صورت ابتلاء به نوع متوسط تا شدید بیماری در مطالعه گنجانده می شوند.
- ۶- آگاهی بیمار از حرکت دندانهای قدامی در طی ۵ سال گذشته.

در مرحله دوم تحقیق (بررسی رابطه از دست دادن اتچمنت و حرکت پاتولوژیک دندان)

بیمارانی انتخاب می شوند که دارای شرط زیر نیز باشند.

۶- وجود حداقل یک دندان مشابه (Homologous) بدون حرکت پاتولوژیک که به عنوان

کنترل استفاده شود. بنابراین بیمارانی که تمام دندانهای قدامی یا هر دو دندان مشابه آنها در یک قوس

دندانی دچار حرکت پاتولوژیک شده باشند در قسمت دوم مطالعه گنجانده نمی شوند.